

四庫全書

子部

欽定四庫全書

普濟方卷三百四十七 明 周王朱橚 撰

產後諸疾門

吹乳 附論

夫產後吹妳者因兒喫乳之次兒忽自睡呼氣不通乳不時洩蓄積在內遂成腫硬壅閉乳道津液不通腐結疼痛亦有不痒不痛腫硬如石名曰吹妳若不急治腫甚成癰產後吹妳最宜急治不爾結癰漸至死者速與

服皂角散枯萋散傳以天南星散以手揉之則散矣

全大

良方

總論云產後乳汁自出蓋是身虛所至宜服補藥以止之若乳後脹滿急痛者溫帛熨之產經有是論却無方以治之若有此證但以漏蘆散亦可亦有未產前乳汁自出者謂之乳泣生子多不育經書未曾論及

方

漏蘆湯

出瘡科  
精要

治婦人吹妳初覺

漏蘆 棟實 大黃 黃芩 芍藥 甘草

各半兩

右為末每服三錢水一盞半燈草三十莖同煎至一盞去滓溫服無時

治吹妳

出瘡科精要

及一切惡瘡初覺一二日立效

瓜蒌

一箇去皮

生姜

一兩去皮

大黃

半兩

甘草

半兩

右共搗作一塊以米半碗同煎至七分去滓入沒藥乳香末共二錢半通一服

鯪鯉甲散

一名通利散

治吹乳癰疼痛不可忍者

出聖惠方

鯪鯉甲

一兩炙黃入  
名穿山甲

木通

一兩  
自然銅  
半錢  
生用

右搗羅為散溫酒下一錢不拘時服

治婦人吹妳

出聖  
惠方

馬明退

五錢  
燒灰

輕粉

三錢

麝香

少  
許

右為細末每服二錢熱酒調下服之

枯萋散

出永類  
鈐方

治產後吹妳腫硬疼痛欲結癰輕則

為吹妳妬乳重則為乳癰

乳香

一錢  
半

枯萋根末

一兩

右研令勻溫酒調二錢服一方天南星末溫湯調塗之

治婦人吹奶痛不可忍

出瑞竹堂

鼠糞

五十粒

麝香

一字

右為細末食後用熱酒一盞調服立愈一方雄鼠糞兩頭尖者昔劉汝翼治一屠戶妻立効但不令病人知恐不肯服

二消散 治吹奶

烏鰂骨

朴硝

各等分

右為細末用葦筒兒盛藥吹入鼻中仍令人用藥末  
傅腫痛處徐徐消去立効

治吹奶腫痛

出海上  
名方

右用胡桃二箇大者取皮細嚼以熱酒二盞送下二  
服立効一方連皮燒存性為末調下治乳癰

吹奶結實疼痛

出危  
氏方

右陳皮一兩甘草一錢水二碗煎一碗分二次服次  
用荊芥羌活獨活煎湯薰之溫則洗之即安

連翹消毒飲

出經驗良方

右用連翹三錢牛旁子防風荊芥穗各一錢甘草一錢並為粗末每服四錢水一盞半煎七分去滓食後服甜薑實肉子每一箇取四分之研碎入藥

又方

出經驗良方

右以生甜薑去殼取子同生姜一小塊研勻炒酒隨意服

治吹奶

出永類鈴方



右用皂角刺燒灰蚌蛤粉乳香少許並為細末熱酒調服手揉散即可一方無乳香

吹乳奶方

右小車耳上油脂垢丸雞頭大每服加一九一日三服一日加一九七日自消八日濃自出有大効

治吹奶

右用甜菜根酒一碗水一碗葱三根同煎至八分服之立効

勝金丹

出衛生寶鑑

治婦人吹奶立有効

百齒霜

今梳上髮之垢也

右一味不拘多少用無根水為丸桐子大每服三  
丸倒流水送下食後令病左乳者左卧右乳者右  
卧於溫處汗出愈用新水傾於屋上接之乃倒流  
水也

葡萄酒 治吹乳

右单用葡萄一枚於燈焰上燎過研細熱酒調服

治婦人患吹乳導經散

右用皂角十挺剉細火內燒過煙盡黑色為末次入乳香沒藥令勻每服二錢溫酒調下

白丁香散 治婦人吹乳初覺身熱及胃乳腫硬是其候也服之能令下乳汁通其血脉立能自消矣

右用白丁香直者研細每服二錢酒調服腫硬者服之立消甚者不過三服

治吹奶不痒不痛腫硬如茄

右以青橘皮三兩湯浸去瓢焙為末非時溫酒下二錢匕

治吹妳

右以水調麪煮如糊欲服即投無灰酒一盞共攪之極熱令如稀米粥可飲即熱喫令人徐徐按之藥行即散也

治吹妳惡寒壯熱

右以牝猪肋脂冷水浸搗妳上立効

治小兒吹妳疼痛腫欲作急疹方

右取蛇蛻皮一尺寸尺燒令黑細研以好酒一盞微  
煖頓服未甚較煎服

消毒飲

右用連翹三錢黃瓜萋仁三十粒搥碎每服四錢水  
一盞半煎食後溫服之

治吹妳有時發動脅痛如打

右以六月七月取地膚子乾末酒服方寸匕日五六

服

治婦人吹妳

右以淘米木杓中砂子七粒酒下以洗帚枝透乳孔

連翹散 治吹妳因兒鼻中氣吹着妳房便遍體熱結

聚或如桃李核疼痛者宜服此消之即免作膿

連翹

一兩半

犀角屑

一兩

川大黃

一兩半 剉碎微炒

川升麻

一兩

木通

一兩 剉

黃耆

一兩 剉

黃芩

一兩

川芒硝

二兩

赤芍藥

一兩

右為散每服三錢以水一中盞入淡竹葉二七片煎

至六分去滓不計時候溫服

治吹妳

右用常使木杓柄上尖燒灰存性傅之

吹妳乳香散 治婦人吹妳增寒發熱堅硬腫痛未成  
膿者服之即消

白丁香

揀直者  
半兩

乳香

三錢

右件二味同研極細分作三服好酒調下食後併進

三服立消

穿山甲丸 治吹妳腫硬疼痛日夜不歇

穿山甲

燒灰

猪牙皂角

燒灰

王不留行

皂莢針

炙微黃

自然銅

研細

蟬殼

蛤粉

胡桃瓢

燒灰各半兩

右為末以車脂和丸梧桐子大不計時候以熱酒下

二十九

治吹妳方

槐花

三分

蛤粉

三分

麝香

一分細研

右為細散不計時候以熱酒調下一錢



露蜂房散 治吹妳疼痛不止或時寒熱

露蜂房

一鹿角一兩

右並燒為灰細研不計時候以熱酒調下二錢

又方

用葛布五尺燒灰細研為散不計時候以熱酒調下  
二錢每日三服

又方

烏蛇

二兩酒浸去皮骨炙微黃

穿山甲

一兩炙黃焦

右為細散不計時候以熱酒調下一錢

又方

蔓荊子

一合炒  
黃搗末

車脂

一兩

右以麴糊和丸如菉豆大不計時候以溫酒調下十

丸

又方

桑螵蛸

三枚燒  
令斷煙

皂莢

一寸去黑皮塗  
酥炙微黃去子

右藥搗為末用酒一中盞煎至六分去滓溫服

又方

出聖惠方

狗糞中骨

燒灰半兩

麝香

一錢

右同研令細不計時候以熱酒調下一錢

蛤粉丸

出聖惠方

治吹妳不痒不痛硬腫如石

右用蛤粉半兩車脂和丸如小豆大每服溫酒送下  
二十九丸不過三服差

又方

出聖惠方

右用龍骨一兩細研為散每服以熱葱酒調下一錢

日三四服

又方

出聖惠方

右以無子皂莢刺一斤點火燒候着撒蔓荊子四兩在內待總為灰即細研每服以熱酒調下二錢服了便按三二十下不過再服効

又方

出聖惠方

右以胡桃燒令煙盡去皮每一顆胡桃瓢用金一片同研以熱酒服服了以手漸按乳上令消如有頭

即外破如無頭即內消日三五度服之以得効為

度

又方

出聖  
惠方

右用半夏一兩湯洗七遍去滑搗羅為散以生薑汁

一匙和酒一小盞調下一錢

又方

出聖  
惠方

右以青蒿末二錢醋漿水一大盞煎五六分放溫頓

服相次服熱酒一盞即差

又方

出聖惠方

雀糞

一十枚

丁香

三枚末

右同研如粉以熱酒調服之

治產後乳汁多無故流出待其乳汁冷然後喫此方

出護

命方

當歸

五味子

續斷

白朮

草薢

各半兩

細辛

官桂

人參

杜仲

防風

炙艾葉

茯苓

川芎

各一分

川椒

三銖

右為細末煉蜜丸如桐子大空心鹽湯鹽酒任下三十丸喫至半月後自然安効平復如故也亦可喫金液丹

治產後乳汁多其乳汁無故自流出喉中乾非時渴不輟思飲湯宜服此方病皆由虛冷所致但色黃瘦喫食減少忽未經數月後行脉氣微弱即喫此方但世多以喉乾悞下涼藥蓋淨汁無故流出則其喉乾并渴從可知也

出護命方

舶上黃

細研當歸各一兩

石斛

艾葉

五味子

白芷

牡蠣

火煨

川芎

山萸

各半兩

防風

藁本

茯苓

芫花

吳茱萸

各一分

右為細末煉蜜丸如梧桐子大早朝空心鹽湯送下  
五十丸

消毒紅玉膏

出德生堂

治吹乳腫疼

寒水石

煨二兩

黃丹

炒半兩

右為細末新涼水調塗兩乳腫處日換二三次即可



消腫

治吹妳

出華佗  
中藏經

水茸角

不拘多少  
瓦上焙乾

右為細末酒調服二錢匕次日即愈如已破者畧有

黃水亦效水茸角狀如腰帶作小窠子生三四月間

開小黃花葉如夜合葉六七月採兩浙呼為含萌

皂角膏

出楊氏  
家藏方

治吹妳腫痛

皂角

不拘  
多少

右用河水揉濃汁去滓熬成膏塗即愈

樺皮散

海岱居士秘方

治吹妳

樺皮

手指大一

皂角子

七個

右二味燒成灰好酒空心調服

治吹妳

出危氏方

右用鱉甲生為末酒下二錢

治吹妳

出本草

右用戸垠下土和雄雀糞暖酒服方寸匕

治吹妳

右取不患病人妳中汁一茶匙多令飲訖卧患一邊良久即安

又方

右用生姜自然汁調蚌粉塗之留妳頭不塗

產後乳結核

夫產後乳結核者以氣血虛弱邪搏之乳脉凝滯故結為核日久不差蘊積生熱甚則腫甚則成癰也

方

枳殼湯

治產後乳結核或成癰腫發熱疼痛

枳殼

去瓢  
麩炒

芍藥

人參

黃耆

剉

木通

剉

當歸

切  
焙

桂皮

去粗

疾藜子

炒去  
角

雞骨

醋炙

大黃

剉炒各  
一兩

右粗搗篩每服二錢水一盞煎七分去滓溫服不拘

時

當歸散

治產後乳結核堅硬疼痛

當歸

切  
焙

芍藥

黃耆

剉

疾藜

炒去  
角

雞骨

炙

附子

炮  
製

去皮

枳實

去瓢麩炒

桂皮

薏苡仁

人參 各一兩

右為散每服三錢酒調服日三

莽草散

治產後乳結核或堅硬疼痛

莽草葉

一兩

紫葛

大黃

各半兩

赤小豆

二兩

右為末醋和如糊傳結核上頻易之每易則先以熱葱湯洗之

傅膏方 治產後乳腫熱痛

黃連

去鬚三分

大黃

生

鼠糞

炒各半兩

右為末用米醋調傅四邊頻易之每易先用熱葱湯洗

麥門冬湯 治產後乳結核及初結作癰服此

麥門冬

去心焙

黃芩

去心

黃耆剉芍藥

甘草

赤茯苓

去黑心

木通

剉各三兩

桑寄生

防風

去人

人參

各三兩

右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半入棗二枚擘煎取一盞去滓入糖一棗大令消溫服不拘時乳漸

銷減即服後門冬丸方

天門冬方 治產後乳結核

天門冬

去心焙  
二兩半

木通

剉

黃耆

剉

防風

去

桑寄生

剉

生乾地黄

焙

人參

各一兩

羌活

去蘆一兩半

大黃

一兩

白芷

升麻

各三分

澤蘭

去枝梗

茯神

去木

天雄

炮去皮臍

黃芩

去黑心

枳實

去瓤炒

五味子

各半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子每服二十九加至三十九

溫酒下日三

外消膏 治產後乳結核疼痛或腫欲成癰

伏龍肝

半兩

大黃

剉半兩

生姜

一兩洗切焙研細

右除生姜外為末和勻用醋調作膏隨小大攤貼病

上早晚易之效

托裏散 治產後乳結核欲壞不壞

威靈仙

洗焙

當歸

切焙

牡丹皮

芍藥

剉

黃耆

剉

桂去粗皮

各一兩

大黃

炮半兩

右為散每服三錢溫酒調下不拘時候



升麻湯 治產後乳腫或結核敗壞熱悶

升麻

白欬

各一兩

大黃

生半兩

黃芩

去黑心

桂

去粗皮各一兩

芒硝

研半兩

人參

黃耆

剉各二分

右為粗末每服三錢水一盞煎七分去滓溫服不拘時

大黃湯 治產後乳結核腫痛發熱煩悶

大黃

剉微炒

棟實

劈破炒去子

芍藥

馬蹄

炙黃焦各一兩

右搗篩每服二錢水一盞煎七分去滓溫服不拘時

蔓荊實散

治產後乳腫痛煩悶熱

蔓荊實

炒二兩

甘草

炙五錢

右為散每服二錢溫酒調下不拘時候服

黃芩湯

治產後初覺有核漸發熱痛累日不退欲成

癰

黃芩

小者

甘草

炙

桑寄生

剉

防風

去

木通

剉

黃耆

剉

麥門冬

焙去心

大黃

各一兩

赤芍藥

一兩

右搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服不

拘時

當歸散 治乳結核堅硬

當歸

切桂去粗皮焙各半兩

芍藥

人參

各三分

蒺藜子

炒去角

鷄骨

炙各一兩

木通

剉

黃耆

剉各一兩

枳實

去穢麤炒三分

右為散每服二錢空腹酒調下日再

治婦人乳生結核堅硬或腫疼痛宜用消毒止疼痛藥

水膏方

黃蘗

一兩糯米

二合

赤小豆

一合

露蜂房

半兩

鹽

一兩

右為散搗生地黃取汁調令稀稠得所量痛腫處大  
小剪絹一方厚塗貼之乾則換之

髮灰散

出聖惠方

治乳中結塞腫痛

亂髮灰

蛇蛻皮灰

各半兩

蔓荊實

微炒一兩

右為散每服二錢溫酒調下日三

無名異散 治乳結顆塊膿水宿滯血脉壅閉惡血疼

痛久不瘥者

無名異 牡丹皮 虎杖根 當歸

切焙

白芷

白茯苓

去黑皮  
各三分

沒藥

研

麒麟竭

研

木香

黃芩

去心

黃耆

人參

桂

去粗  
皮

熟乾地黄

焙各  
半兩

右為散每服三錢空腹煎棗湯調下日三服

又方 治妳結鞭疼痛

用百藥煎為細末每服三錢酒一盞煎數沸熱服再  
以滓傳腫痛處

又方

用鰈魚皮燒灰存性為末空心酒調服

療乳癰止痛方

大黃

黃連

各三兩

右用水五升煮取二分三服下即愈

內消散

治婦人乳癰毒始生核

川大黃

黃芩

黃連

去積

黃藥子

地龍

炒令黃

乳香

各一兩

右為細散用生地黄汁調勻塗於腫毒上若乾即易之不過三五度瘥

當歸散 治婦人乳生結核疼痛散毒氣止疼痛

當歸

三分  
剉  
微炒

甘草

一兩  
剉

川芒硝

一兩

黃連

三分  
去鬚

黃藥子

三分

川大黃

一兩

蒲公英

三分

玄參

三分

右為細散用鷄子白調為膏於生絹上塗貼取効為度

治婦人乳生結核及腫疼

藍草根

生翦頭

各二兩

右搗如泥貼之立効

療產後乳初結脹不消令敗乳自退方

瓜蒌

一箇半  
生半炒

大粉草

一寸半  
生半炒

生姜

一塊半  
生半煨

右同剉用酒一碗煮取一盞去滓服之其痛一會如  
不可忍即搜去敗乳安臥每一服順所患處乳側臥  
於床上令其藥行故也

產後乳結癰

附論

產後衝任不足氣血俱虛潛行入于足陽明之脉其直  
行者從缺盆下乳內蕪下夾臍入氣衝中衝脉者起于



氣衝並足陽之經夾臍上行至胸中而散也其經為邪熱衝則血為之擊搏氣為之留滯擊搏則痛作留滯則腫生內經所謂營氣不從逆于肉理乃生癰腫此疾者以乳汁蘊積與氣相搏故也

方

當歸飲 治產後乳癰欲結發熱腫痛

當歸

切焙

芍藥

牡丹皮

生乾地黄

焙

人參

黃耆

剉

大黃

生

升麻

連翹

各一兩

右粗搗篩每服五錢水一盞去滓溫服不拘時

黃耆湯 治產後乳結核或腫痛漸成癰煩熱

黃耆

剉

生乾地黄

焙

麥門冬

焙

去心

升麻

各一兩半

人參

赤茯苓

去黑皮各一兩

當歸

切焙

芍藥

遠志

去心

甘草

生各半兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半去滓溫服不拘時候

蛇蛻皮散 治乳癰疼痛寒熱發歇晝夜不可忍

蛇蛻皮

燒灰半兩

麝香

二錢

右研細每服二錢熱酒調下不拘時

芍藥湯 治產後乳結癰濃敗壞不散發熱疼痛

芍藥

桂

去粗皮

黃耆

剉

赤茯苓

去黑皮

當歸

切焙

生乾地黄

焙各一兩

甘草

剉

麥門冬

去心焙

人參

各一兩

右㕮咀如麻豆大每服五錢水一盞半再入生姜一

棗大煎至八分去滓下朴硝末一錢再煎令沸溫服

不拘時

甘草飲

治產後乳癰熱痛未結膿者

甘草

半兩半生半炙

桔萋

一枚去皮用穰

右先以酒三盞煎甘草至二盞入桔萋穰煎至一盞

去滓溫服半盞如痛即以酒少許解之未効再作

桔萋散 治產後乳癰膿潰未潰熱痛不已

桔萋實

二兩敗醬

細辛

去苗葉

乾姜

炮

厚朴

去粗皮姜汁炙

桔梗

炒防風

去人參

各半兩

右為散每服三錢溫酒下水一盞煎至八分溫服亦

得不拘時

黃耆膏 治產後乳癰欲結未結膿攻痛

黃耆

剉

芎藭

當歸

切炒

黃芩

去黑心

黃連

去鬚

白欬

芍藥

防風

去叉各一兩

右為末用鷄子白調隨大小貼之每日一易

猪蹄湯洗方 治產後乳癰破後膿血不盡

猪蹄

具一

當歸

切炒

芍藥

黃芩

去黑心

獨活

去蘆頭

莽草

大黃

剉碎炒

芎藭

各半兩

右搗羅七味為末將猪蹄剉洗令淨以水五升煮熟

去滓澄清內藥再煎令熱通水手洗乳上令透拭乾  
良久又暖洗不拘次數

漏蘆膏 治乳汁不時泄蘊積于內遂成癰

漏蘆

黃芩

去黑心 各一兩 米粉 半兩

右為末新水調如膏塗之

麥門冬 治乳腫初覺有異

生麥門冬

去心

黃耆

剉

防風

去叉各一兩半

桑寄生

一兩半

甘草

炙三

木通

二兩半

黃芩

去黑心

赤芍藥

各一兩

右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半入棗二枚煎至八分去滓內乳糖一分再煎一兩沸去滓溫服

芍藥散 療乳癰腫消核

芍藥 通草 桂心 昆布 白欬 附子

炮

黃耆 人參 海藻 木占斯

各一兩

右搗散以清酒服一錢日三當先食并療頤下氣結瘰癧

栢皮膏 乳癰衆醫不能療

用猪膏年多者佳栢皮三斤去黑皮以猪膏煎之當  
消煎栢皮熟黑便漉出更煎餘栢皮如初膏盡以塗  
瘡處甚驗

三物桂心貼 治乳癰

桂心 烏頭 甘草

各二分

右搗散以苦酒和塗腫上以濕紙覆濡其上將乳居  
其中以乾布置乳下須臾布當濡有膿水也

又方



研米槌二枚煮令熟以絮布巾覆乳上用二槌更互  
熨腫數十過差止已用大驗

治乳癰堅硬痛不可忍

右良姜子半大匙當年新者服時不得嚼破以清水  
一大盞和頓服痛即止

治婦人乳癰

覺痛色未變時以飼猪米研汁飲之即瘥仍取猪槽  
木厚如匙面炙數熨

治婦人乳癰疼痛宜薰方

十便良方

露蜂房

半斤細剉

右件藥以醋五升煮令熟相和傾於瓶中熟薰乳上日三五度即差冷即再煎之效

又方

十便良方

大黃一分竈上黃土一分生姜二分

右三味搗羅為末醋和塗乳痛即止極驗劉消子不用生姜用生魚三味等分魚必用鯽魚妙

三能散

十便良方

治妳癰

綿黃耆

皂角刺

燒存性各一兩

右搗羅為散以酒調二錢服能穿能散

香蛤散

楊氏家藏方

治婦人妳癰纔覺作痛氣欲結者便

服此藥令內消

車螯殼

火煨一兩

乳香

半兩炙剉

膩粉

五分

右件為細末每服一錢用乳香溫酒送下食後日進

三服

聖棗散

楊氏家藏方

治乳癰

用棗四十九枚燒灰留性不拘癰大小盡用棗灰及糞堆上土研細三四錢和勻以新汲水調傳

治奶癰結聚成塊疼痛難忍

護命方

好肥皂角

二條香葱十枚

右先搥皂角碎水一碗揉取汁煉成膏却碎揉葱入內更煎三兩沸紙攤貼痛處露奶頭令清水出只初痛一兩日可使已成膿者便不可使

通和湯

衛生寶鑑

治婦人乳癰疼痛不可忍者亦治吹奶疼

痛不可忍

穿山甲

一兩炮黃

木通

剉一兩

自然銅

半兩醋滓七次

右為細末每服二錢熱酒調下食遠服之

又方

衛生寶鑑

治奶癰瘡

凡未成瘡纔覺腫硬作痛以葱早熨之其法用中樣小甕瓶瓶口寬者以炭火入瓶內上以熱灰填滿瓶口將葱葉葱白搥損令徧覆瓶口以手怕子裹定

熱將瓶口向腫處任意輕輕熨之有驗

治產後忽然乳痛堅硬成塊欲成癰腫先喫此方但臍腑熱覺得乳痛即喫此方

麻黃

去根連

翹子

各半兩

知母

射干

當歸

大黃

蔓荊子

芍藥

荊芥穗

牡丹皮

去心各一分

半夏

三錢

木通

四銖

右為細末每服三錢水一盞生姜三片同煎取九分

食後臨卧去滓喫再煎連喫以大腑通為度

治吹奶癰腫痛疼熱發渴晝夜呻吟

蛇蛻皮

一兩  
燒灰

赤小豆

一兩

右件藥搗羅為散以鷄子白和調傳之

治乳癰結硬欲作癰

十便良方

用真樺皮溫熨腫處一夕即消

又方

永類  
鈴方

用萱草根又名射干研爛生酒濾過以滓貼瘡久患

此腐爛見骨膜垂死者用萱草根其葉柔其根如麥

門冬并蒹蓄根如殭蚕葉硬如劍者傳之神効

治產後不自乳兒畜積乳汁結作癰

肘後方

取蒲公英搗傳腫上日四度易之俗呼為蒲公英語  
訛為蒲公英明者是也火煮汁服亦得

治產後患乳癰腫痛因產後不見乳汁結作癰

用蒲黃炒熱杵傳腫上日三度易之又以井華水煎  
葉汁飲之亦佳食之亦得妬乳及癰並瘡

又方

千金方



用皂角十條以酒一升揉取汁硝石半兩煎成膏傳之

連翹湯

拔萃方

治產後妬乳並癰

連翹

升麻

芒硝

各十分

玄參

芍藥

白欬

防己

射干

各二分

大黃

十二分

甘草

六分

杏仁

八十枚去皮尖

右以水九升煎取三升次下大黃硝分三服

復元通氣散

永類鈴方

治乳癰

瓜蒌

青皮

烏藥

白芷

各等分

初發服甚效病已半勿多服穿山甲等藥惟專發散也懸癰通用

治乳癰

本草

取人齒燒灰細研酥調貼癰上

治乳癰

本草

以烏雌雞膽汁傳之日三

療乳癰痛寒熱者

本草

取蔓青根并葉淨擇去土不用水洗以鹽搗傳乳上

如熱即換不過三五易之即瘥冬月無葉但單用根亦可切須避風

產後悶煩

附論

夫產後煩悶者由產後臟腑勞傷血氣虛損而風邪乘之搏于血使氣不宣而否澀則生於熱或肢節煩疼口乾因虛生熱則多煩悶此乃表裏俱虛血氣未復而氣逆乘之故悶煩也。○新產之後血氣俱虛或因亡血過多或因惡血下少致血氣不利陰陽相勝陽勝則發煩

悶經所謂陽勝則熱是也

方

淡竹葉湯 治產後血不利心煩喘悶

淡竹葉

麥門冬

去心焙

小麥

白茯苓

去黑皮各一兩

右為散粗搗篩每服二錢水一盞生姜三片煎至七分候去滓溫服空心日午臨臥各一

蒲黃散 治產後血氣痛煩悶渴燥

蒲黃

一兩乾姜

兩炮半

薑黃

切

當歸

切

桂

去粗皮

右為散每服一錢煎人參湯調下空心日午臨臥服

麥門冬湯 治產後煩悶或血氣不快

麥門冬

去心焙  
二兩

甘草

炙  
劉

白茯苓

去黑  
皮

人參

各一  
兩

右粗搗篩每服三錢水一盞生姜三片棗一枚煎至七分候入竹瀝半合再煎數沸去滓溫服

黑金散 治產後血氣煩悶腹痛脹滿

赤龍鱗

燒灰  
研

亂髮

燒灰  
研

當歸

切  
焙

人參

二分

麝香

別研  
一錢

白茯苓

去黑皮  
二分

硃砂

去沙石  
研一分

犀角

鎔

枳殼

去瓢  
麩炒

大黃

剉炒各一分

右除髮灰并麝香外搗羅為細散合研勻每服一錢

溫熱水調下空心日午臨卧服

羚羊角散 治產後血氣煩悶腹痛

羚羊角

燒灰

延胡索

黃耆

剉

枳殼

燒灰

芍藥

白茯苓

去黑皮

劉寄奴

各半兩

右為散每服二錢煎人參湯調下空心日午臨卧服

地黃飲

出聖惠方

治產後血氣不利心胸煩悶脅肋滿口乾

壯熱不思飲食

生地黄汁

一盞當歸切焙搗末二兩

生薑汁

各半兩

童子便

一盞一人參搗末一兩

右四汁相合每服用汁半盞永半盞入人參當歸末各半錢同煎至七分空心日午臨卧溫服一方無人參名曰地黄飲子不拘時候服

紫葛飲

出聖惠方

治產後心中煩悶不解

紫葛

剉麥門冬去心焙

人參

羚羊角

銚小麥

甘草

炙剉各半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞入生姜三片棗一大枚  
擘煎至七分去滓溫服不拘時候

竹茹散 治產後悶煩氣短

竹茹 人參 白茯苓

去黑皮

黃耆

剉

當歸

切焙

生地黄

焙各半兩

右為散每服二錢溫酒調下不拘時候

人參散 治產後虛煩氣短心下不利



人參 烏藥

各一兩

檳榔

剉半兩

黃耆

剉三分

木香

一分

熟乾地黄

焙一兩

麥門冬

剉心炒

甘草

炙剉各三分

右為末每服二錢沸湯調下不拘時候

人參丸

治產後虛煩氣血滯攻腰腹痛煩悶少力

人參

一兩

延胡索

桂

剉粗皮

芎藭

木香

當歸

切焙

白茯苓

去黑皮

厚朴

剉粗皮生薑汁炙

蒲黃

白芷

各一兩

熟乾地黄

焙二兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九酒下每

日三服

白茯苓湯

治產後氣血虛心膈煩滿身腫體熱惡露

不行

白茯苓

去黑心

赤芍藥

芎藭

各一兩半

桂皮去粗

大腹皮

剉

枳殼

去穰麩炒

熟乾地黄

焙各一兩

右粗搗篩每服三錢以水一盞生姜三片煎至七分

即去滓溫服日三

當歸湯

治產後虛煩腹痛

當歸

切培

芍藥

木通

判各一兩

右粗搗篩每服二錢水一盞半入生地黄二寸許切  
碎同煎煎至八分去滓溫服不拘時候

真氣湯 治初產後血氣煩悶

童子小便

三合

生地黄汁

一合

右相和微煎三四沸分溫二服

逍遙湯

出危氏方

治產後無陰血虛心煩自汗精神昏冒心

忪煩赤并口燥咽乾發熱頭痛或寒熱如瘧

白茯苓

去黑皮

白朮

當歸

切焙芍藥

柴胡

去苗各一兩

右粗搗篩每服二錢水一大盞入乾生薑一塊切破薄荷五葉同煎七分去滓熱服不拘時候

人參當歸湯

出千金方

治產後陰虛生內熱煩悶不安

人參

當歸

麥門冬

乾地黄

桂心

各一兩

大棗

二十枚

粳米

芍藥

四兩

淡竹葉

三升

右㕮咀以水一斗二升先煮竹葉及米取八升去滓

內藥再煎煮取三升去滓分三服若煩悶不安者當

取豉一升以水三升盡服之甚良地黃用生乾者虛甚則用熟者

赤小豆散

出千金方

治產後煩悶不能食虛滿

用赤小豆三七枚燒作末以冷水和頓服之

治血氣煩悶脇肋脹滿及痛

一名荷葉散

芍藥

八分

蒲黃

各四分

延胡索

六分

當歸

三箇

右以水二升煎取七合後入蒲黃空心分三服

治血氣煩悶方

出大全良方

右以竹瀝飲一盞甚効或生藕汁飲二升亦効

知母湯

出千金方

治產後乍寒乍熱通身不快心胸煩悶

知母

三兩

芍藥

黃芩

炙二兩

桂心

甘草

炙一兩

右以水五升煮取二升半分三服一方不用桂

心加生地黃

竹葉湯

出千金方

治產後心中煩悶不解

生淡竹葉

一升

麥門冬

一升

甘草

二兩

生薑

各三兩

大棗

十四枚

小麥

三合

右呖咀以水一斗先煮竹葉小麥取八升內諸藥煮  
取三升去滓分三服若心中虛悸者加人參二兩其  
人食少無穀氣者加粳米五合氣逆者加半夏二兩  
大全良方  
不用茯苓

蒲黃散

便產  
須知

治產後煩悶虛煩悶去血多則除虛而生

內熱其證心胃燥滿短氣頭痛悶亂骨節痛晡時輒  
甚

用蒲黃紙上炒以東流水和服方寸匕極良

治產後煩悶不能食

用白犬骨一味燒研以水服方寸匕

療產後心悶不識人汗出乃血氣衝心及胃脇腹肚熱

時作時止

出肘後方

用羚羊角燒如末以東流水服方寸匕未瘥再服

治產後煩躁

用禹餘糧一枚放入醋瓶內入地埋一半四面緊築用炭一秤發頂火一斤煨去火三分耗二為度用溫



砂土罨一宿取出打去外面一重只使裏內細研淘澄五七度將紙襯乾再研數千遍患者用甘草煎湯調二錢匕只一服立効

治產後惡血煩悶

用羚羊角燒灰酒服方寸匕未瘥再服亦治產難

治產後心悶眼不得開

出千金方

即當頂門上取髮如兩指大使人強牽之眼即開

紫葛飲子

治產後心中煩悶不解

紫葛

半兩

麥門冬

半兩  
去心

生地黃

半兩

小麥

半兩

生薑

一分

甘草

一分炙  
微赤剉

右細剉和勻分為三服以水一大盞煎至五分去滓

不計時候溫服

麥門冬散

出聖惠方

治產後因虛生熱致生心神煩悶

麥門冬

去心  
一兩

羚羊角

半兩  
屑

人參

一兩半  
去蘆

蒲黃

一兩

甘草

半兩  
炙剉

右搗篩為散每服三錢以水一盞入竹葉二七片小

麥半合煎至六分去滓不計時候溫服

黃耆散

出聖惠方

治產後口乾煩悶心躁

黃耆

一兩

麥門冬

一兩

赤茯苓

一兩

生乾地黄

一兩

當歸

半兩炙甘草

微赤判

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎

至六分去滓溫服不計時候

蒲黃散

出聖惠方

治產後血氣上攻胃膈煩悶不安

蒲黃

一兩

當歸

一兩

麥門冬

去心

赤芍藥

一兩

鬼箭羽

半兩

生乾地黃

一兩

右搗篩為散每服三錢以水一中盞入竹葉二七片粳米五十七粒煎至六分去滓不計時候溫服

竹茹飲子

出聖惠方

治產後內虛煩悶短氣

竹茹

一人兩

參

一兩去蘆頭

黃耆

一兩一作黃芩

甘草

一分炙微赤剉

白茯苓

一兩

右細剉和勻每服半兩以水一大盞入棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服一方無棗

紅藍花飲子

出聖惠方

治產後血氣攻心煩悶氣欲絕不識

人

紅藍花

半兩

紫葛

半兩

赤芍藥

半兩

生地黃汁

三合後下

童子小便

三合後下

蒲黃

半兩

右件以水一大盞酒半盞煎至八分去滓下地黃汁

并小便更煎三兩沸不計時候分溫三服

琥珀散

出聖惠方

治產後惡血不下心膈煩悶

琥珀

一兩

蒲黃

一兩

劉寄奴

一兩

赤芍藥

一兩

蓮子

心半兩

鬼箭羽

半兩

右搗細羅為散每服不計時候以豆淋酒調下二錢

芝麻散

出聖惠方

治產後燥熱心神煩悶

芝麻

一兩

紅藍花

半兩

當歸

半兩

剉微炒

赤芍藥

半兩

琥珀

半兩

嫩荷葉

半兩

右搗細羅為散每服不計時候以生地汁調下二錢

治產後心神悶煩眩迷不省唇口冷脉欲絕面青血氣

上衝宜急服此方

聖惠方

醎醋三鷄子

一箇打破  
馮在碗中

右先煎醋一沸傾入鷄子碗中頓熱服之立効

治產後煩悶手脚燥熱懨弱氣欲竭血暈心頭硬乍寒

乍熱用此方

聖惠方

用續斷枝一握水一盞半煎至一盞分三服

治產後惡血不盡心膈煩悶腹中刺痛宜服此方

聖惠方

延胡索

一兩  
益母草半兩

右搗羅為散不計時候以溫酒調下一錢

又方

聖惠方

用生地黄四兩細切酒二大盞煎至三五沸去滓分  
為五次服不計時候服之

又方

聖惠方

當歸

一兩剉  
微炒

鬼箭羽

二兩

右搗羅為散每服不計時候以紅藍花酒調下二錢

治產後虛勞心熱煩悶不識人方

聖惠方

取生鷄子一枚打破去殼吞之



又方

聖惠方

童子小便

一盞

生薑汁

一盞

生地黄汁

一盞

右相和煎一沸放溫分為二服頻頻服之

又方

聖惠方

生地黄汁

一中盞

童子小便

一中盞

蒲黃

半兩

右相和攪令勻不拘時候分溫四服

又方

聖惠方

以生藕搗絞取汁煖飲一小盞頻頻服之

凡產後忽冒悶汗出不識人者暴虛故也

危氏方

用破鷄子三枚可與童子小便一升吞之便醒不然  
丈夫小便一升亦得切不可用病人者○又若久不  
識人或時復發者此為有風因產血氣暴虛風行脉  
中故也若產後去血多者又增此疾與鷄子不醒  
者可急作竹瀝汁一服五合須臾不定再與五合頻  
與三五服即瘥

治婦人產後胃滿悶不思飲食四肢潮熱

用柴胡湯一帖黃芩三兩用水二盞煎至半空心服  
治產後血悶血竭

用藕節和生地黃搗汁熱酒并小便調下

治產後血脹悶

用甘蕉根搗汁服之

治諸虛煩熱

以竹葉石膏湯溫膽湯服之但產後與尋常不同如

石膏等藥不宜輕用

人參葳靈散

衛生家寶

治產後痞氣胃膈不快噎悶不進飲

食

人參 茯苓 藿香葉 白芷 甘草

炙

桔梗

各一兩

葳靈仙

一分微炒

右件為末每服一大盞棗二枚薑二片水一盞慢煎至八分空心食前溫服

治產後血脹悶欲死者

本草

以水和苦酒煮蘇方木五兩取濃汁服之効

治產後血悶止痛

本草

以折傷木酒煮濃汁飲之

治產後血腹悶

本草

以蕤花搗汁服之

產後煩渴

附論

夫產後煩渴者由產時水血俱下臟腑乾燥津液不足因虛則生熱故令煩渴也

方

地黃散

聖惠方

治產後煩渴壯熱不思飲食

生地黃

一兩

赤茯苓

一兩

麥門冬

三分

葛根

半兩

剉

石膏

一兩

甘草

一分

炙

微赤剉

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚約煎至六分去滓不計時候溫服

蓀蓀根散

聖惠方

治產後煩渴體熱食少

蓀蓀根

一兩

甘草

一兩

炙

人參

一兩

麥門冬

一兩

去心

生乾地黃

一兩

蘆根

二兩

赤茯苓

一兩

益母草

一兩

剉

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚  
約煎至六分去滓不計時候溫服

黃耆散

聖惠方

治產後體虛煩渴喫食減少乏力

黃耆

一兩剉

麥門冬

去心半兩

生乾地黃

一兩

甘草

一分炙微赤剉

人參

三分去蘆頭

陳皮

三分湯浸去白穰焙

白茯苓

一兩

桑寄生

半兩

右為散每服三錢以水一中盞生薑半分棗三枚竹

葉二十七片同煎至六分去滓不計時候溫服

紅藍花散

聖惠方

治產後煩渴不止

紅藍花

一兩

芝麻

一兩

栝蒌根

一兩

生乾地黄

一兩

甘草

半兩炙微赤剉

菰根

一兩

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚

同煎至六分去滓不計時候溫服

人參散

聖惠方

治產後煩渴體熱食少

人參

一兩去蘆頭

麥門冬

一兩去心

石膏

一兩

當歸

一兩剉微炒

甘草

半兩炙微赤剉

菰根

三分

生地黄

三分

柴胡

三分去苗

赤茯苓

三分



右搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗

三枚同煎至六分去滓不計時候溫服

蓮子房散

聖惠方

治產後煩渴不止

蓮子房

二兩秋前者

甘草

一分炙微赤剉

人參

一兩去蘆頭

麥門冬

三分去心

蘆根

一兩剉

右搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分大

棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

益母草散

聖惠方

治產後血運煩渴口乾心燥

益母草

一兩

人參

半兩去蘆頭

黃耆

半兩剉

葛根

半兩剉

生乾地黄

半兩

甘草

一分炙微赤剉

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分約煎至

六分去滓不計時候溫服

羚羊角飲子

聖惠方

治產後心胸煩渴不解

羚羊角屑

一分

竹葉

二十片

小麥

半兩

棗

五枚

生薑

一分

赤茯苓

半兩

右細剉和勻分為五服以水一中盞煎至六分去滓

不計時候溫服

又方 聖惠方

生藕汁

合三

生地黄汁

升半

童小便

合五

白蜜

合二

右相和煎三五沸不計時候分溫三服

治產後忽口內煩渴狂語方

聖惠方

右蘇枋木一兩水二大盞煎至一盞去滓放溫漸漸

服盡其渴立止

紅藍花散

楊氏家藏方

治產後調順氣血治虛煩渴燥或乳

脉欲行頭昏寒熱

川芎

當歸

洗焙

蒲黃

各等分

右件為細末每服三錢水一盞入荷葉心一斤黑豆三十粒同煎至七分溫服不拘時候

桃花散

保命集方

治產後不煩而渴

新石灰

一兩

黃丹

半錢

右為細末渴時冷漿水調一錢



普濟方卷三百四十七

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百四十八

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣楊懋珩

校對官中書臣吳甸華

謄錄監生臣李大任

欽定四庫全書

普濟方卷三百四十八

明

周王朱橚

撰

產後諸疾門

產後血暈

附論

夫產後血暈者由敗血流入肝經眼見黑花頭目旋暈不能起坐甚至昏悶不省人事謂之血暈溫酒調黑神散或清菟散最佳○庸醫或作暗風中風治之必難愈○凡暈血熱乘虛逆上湊心故昏迷不省氣迷欲絕是

也然其由有三有用心使力過多而暈者有下血多而暈者有下血少而暈者其暈雖同其治特異當詳審之下血多而暈者但昏悶煩亂而已當以補藥清心藥治之下血少而暈者乃露惡不下上搶於心心下滿急神昏口噤絕不知人當以破血行血藥治之古法有云產婦纔分娩了預燒秤錘或江中黃石子硬炭燒令通赤置器中急於床前以醋沃之得醋可除血暈產後一臘不妨時作為妙○凡暈者皆是虛熱血氣奔逆腹中空



所致欲分挽者第一須先取醞醋以塗口鼻仍置醋於旁使聞其氣兼細細飲之此為上法如覺暈即以醋噴面甦來即飲醋仍少與解之一云仍少與水解之一法燒乾漆令煙濃熏產母面即醒如無乾漆以舊破漆器猛火燒熏之亦妙○經行候迷悶者有去血多而悶去血多者是為血虛則心虛心虛則手足顫神魂亂則坐卧不安眼見黑花甚者迷悶去血少者是為血迷血迷則隨氣上逆停留於心竅心下急滿無所歸神魂如醉

不能言語產後迷悶者是為血暈血暈則虛而無所歸  
氣無所主氣血妄行掩觸心肺遂使眼花頭眩神昏憤  
不知人事唇青肉冷口中絕氣雖數日有此證凡覺神  
昏悶絕宜服八寶九治之○產後血暈者是產母下血  
或少或多皆令五臟運動氣血未定敗血奔迸攻衝心  
肝若產去血過多則血虛氣極若下血氣逆則血隨氣  
上逼心也二者皆令人運悶心煩滿急若血暈不止則  
斃矣若敗血攻於肝肝臟氣虛所以眼花心煩而欲絕

也又云夫血暈煩悶氣欲絕者由產後出血過多血氣虛極因此而悶絕也又有下血少而氣逆極則血亦隨之上衝心亦令煩悶而滿急然亦當濡其產婦血下多少則知其產後應暈與不暈也然暈不止則斃人凡產時當向坐卧之處須順四時若觸犯禁忌多令暈悶故血下或少或多是以產處若有觸犯多致災禍爾○血暈眩暈須量虛實若宿有痰飲等病不除產後多致眩暈及血氣虛弱而使血逆上攻此又非清菟可療崔氏

曰凡暈者皆是虛熱血氣奔迸腹中空所致欲分挽者  
先取醞醋以塗口鼻仍以醋火淬於傍使聞其氣兼細  
細飲之此為上法可以免其暈也○治血暈之證有三  
宜仔細辨證用藥若血少而運者乃惡露不下上搶於  
心心下滿急神昏口噤不知人事宜破行血之藥黑神  
散神妙若血多而忽暈者但神魂煩亂而已宜補血清心  
之藥芎歸湯神妙若下多虛極羊肉湯當歸建中湯若  
身體素多風疾因產傷積氣血乘虛而暈四物湯加防

風羗活若暈悶而熱多者獨活柴胡湯并治風痰藥若  
下多氣虛極暈昏不知人息欲絕暈不止則殺人若作  
暗風治之謬矣但服清魂散自愈

方

陳橘皮湯 治產後惡血下多氣虛頭目眩眩沉沉默  
默不省人事調氣益血

陳橘皮

去白炒

白朮

切炒

人參

甘草

炙剉

黃耆

剉

酸石榴皮

洗切

熟乾地黄

各半兩

右粗篩分作三劑每劑用水五盞加生姜五片棗五枚擘同煎至三盞去滓時服一盞稍熱服

未漚麻

聖惠方

治產後預防百病喫醋墨了便服此神效

未漚麻

一握去土一尺已上取枝及時陰乾

赤芍藥

二兩芎藭三分

當歸

三分剉微炒

甘草

三分炙微赤剉

茯苓

三分陳橘皮

一兩湯浸去白炒

亂髮

一兩半

右搗羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分約煎至五分次入酒二合更煎三五沸去滓溫服

治血暈至急宜服白瓷藥散

聖惠方

用白瓷藥燒令通赤承熱搗研令細不計時候以溫

酒調下一錢

當歸湯 治產後敗血不盡衝心迷悶旋暈不語

當歸

切焙

芎藭

芍藥

桂

去粗皮

生乾地黄

微炒炙一分

牛膝

去苗酒浸切焙

獨活

去蘆頭

劉寄奴

各半兩

右粗篩每服三錢水一盞入生薑五片煎至七分去

滓溫服不拘時候

璚瑁散 治產後則血不下上衝心腹疼痛

璚瑁

鎔三分

蒲黃

琥珀

別研如粉

好墨

牡丹

去心各半兩

赤龍鱗

燒灰即鯉魚皮

延胡索

當歸

微炙

芎藭

各三兩

右為散每服二錢用煖生薑酒調下淡醋湯亦得不拘時候服之

荷葉湯 治產後血暈悶絕唇口青色不省覺者宜先

用生鷄子清一枚打勻口灌入即定却服此方

荷葉蒂

七枚

蘇枋木

剉碎三分

牛膝

去苗切焙乾

延胡索

各半兩



芍藥

半兩

右粗搗篩每服三錢水酒共一盞煎至六分去滓溫

服如暈甚不省拘開口灌之

敗醬湯 治產後惡血結聚血氣衝心暈垂死者

敗醬

羌活

去蘆頭

當歸

微炙切

芍藥

芎藭

瞿麥

用蔥子各一兩

桃仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒黃色三十枚

枳殼

去穰麩炒黃

桂

去粗皮各三分

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓下馬牙

硝半錢更煎數沸溫服空心相次再服利三二行惡  
血下為効

延胡索湯 治產後血暈

延胡索

芍藥

各一兩

生乾地黄

二兩

牛膝

去苗

當歸

切焙

人參

各二兩半

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓入白蜜  
一匙許更煎令沸溫服相次再服

琥珀煎 治產後血暈無問冷熱悉主之

琥珀

一兩判研末

生地黄汁

一盞生薑汁

一盞

右先取地黄生薑汁二味相和緩火煎去一半別下無灰酒一盞又煎候如稀餚方取琥珀末入煎中熟攪置於瓷器中空心取半匙溫酒調服

紅藍花湯

治產後血下少暈悶嘔逆

紅藍花

蘇枋木

各半兩對

右粗搗篩每服三錢水一盞煎取七分去滓溫服相

次再服

芍藥湯

出大全良方

治產後血暈心悶不識人言語錯亂少

氣者

芍藥

分

生乾地黄

焙

甘草

炙令赤各一兩

丹參

半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞生薑一分切碎同煎至七分去滓下白蜜少許再煎令沸溫服相次更服

當歸飲

治產後血暈欲絕

當歸

微炙一兩

鬼箭羽

二兩

右粗搗篩每服三錢酒一盞煎至六分去滓溫服相

次再服

延胡索散 治產後血暈不識人

延胡索 劉寄奴 當歸

微炙各一兩

右為散以溫酒二錢服之須臾便下

芍藥湯 治產後血暈絕不識人

芍藥

半兩末

亂髮

一兩燒灰

右相和研令勻每服二錢以熱酒調溫服之須臾再服立效

地黃湯 治產後血暈心悶不識人神言鬼語氣急欲

絕

方見本門惡露不下盡類

又方

出大全良方

荷葉

三枚炙

真蒲黃

一兩

生地黃汁

半升

白蜜

一匙

甘草

二兩

右細切以水三升煮取一升去滓入蒲黃蜜地黃汁

煖服立愈妙

赤馬通飲子

出聖惠方

治產後血暈狂語不識人狂亂

童子小便

五合

生地黃汁

一合

赤馬通

七枚

紅雪

八分

右以上二味浸赤馬通絞去滓下紅雪分為兩服一方無紅雪用當歸末半兩分三服

獨行散

出拔萃方

治產後血暈昏迷不省悶絕衝心

用五靈脂二兩半生半炒為末調溫酒中下二錢口噤者拗開口灌之即愈一方用熟水調服若血崩不止用炒熟者當歸酒同煎或水酒童便各半盞同煎又方水煎為膏加神麴末和九桐子大空心溫酒下一方加荊芥等分為末童便調下

又方

出肘後方

治產後血暈

用神麴為末熟水調二錢亦治產難不差再服

療產後血暈狂言煩渴不止

出大全良方

用生香附子去毛為末每服二錢水一盞薑三片棗一箇煎至七分溫服一方治用力過多血暈者宜服此調氣

治產後血暈危困

生地黃汁

一大盞

當歸

一分剉

赤芍藥

一分剉



右水三五六沸溫服如覺煩熱去當歸入童子小便

半盞妙

治產後血暈全不省人事極危殆者

出大全良方

用韭菜切入在一有嘴瓷瓶內煎熱醋沃之便密縛瓶口以瓶嘴向產婦鼻孔令醋氣透入須先扶病人起惡血衝心故有此證韭能去心之滯血加以醋氣運達之用無不効

紅藍花酒

出大全良方

療血暈絕不識人煩悶言語錯亂惡

血不盡腹中絞痛及治胎死腹中不下

用紅藍花二兩為末分二服每服溫酒二盞童子小便二盞煮取一盞半候冷分為二服留滓再併煎一方無童便一方攪新水服如口噤幹開灌之如子死腹中服之立下

療產乳暈絕方

出大全良方

用洗兒水飲三合良○或以惡血服少許良

半夏散

出經驗良方

療產後血暈

用半夏不以多少為末如豆大內鼻中即省亦療五  
絕作末啗鼻亦可

又方

出千金方

用生赤小豆搗末取東流水和服方寸匕不差再服  
救急同

治產後血暈腹疼頭旋及臍腹痛

一名末藥散  
出聖惠方

用沒藥為末每服一錢溫酒調下

牡丹散

出聖惠方

治產後血暈悶絕狼狽若口噤則撬開灌

之必妙

牡丹皮 大黃蒸 芒硝各一兩 冬瓜子半合

桃仁三七粒  
去皮尖

右判散每服五錢水三盞煎至盞半去滓入芒硝後

又煎分二服欲產先煎下以備緩急金匱以此治腸  
癰兩服即愈

益母草散出仁  
存方 治產後血暈心悶亂恍惚如見鬼

生益母草汁三合根  
亦可 生地黄汁三合 童子小便一合

鷄子清三箇

右煎藥汁令熱入鷄子清攪勻作一服

芫臺子散 治婦人產婦血暈及九竅內血出煩渴不

止欲死者此方可救

方見本門惡露不下類

血暈藥

出百一選方

治產後更須准備

用輕烟墨二錢用火煨通紅甯威火氣研為細末可

作一服溫酒調下京墨亦可

清魂散

一名芎藭湯出仁存方

治產後血暈者何荅曰產後血暈

因產所不過多血氣虛極是致暈悶甚則昏塞不知

人氣息欲絕暈悶不止則能斃人若作暗風治之誠為謬矣但服清魂散自瘥如芎藭湯黑龍丹皆惡藥也或以漆燒煙熏其鼻更於產婦房室中須用醋炭為佳

澤蘭孫

一作澤蘭葉

人參

去蘆各一兩

川芎

二兩

甘草

八錢一方無

荊芥穗

四兩

右為末每服三錢重熱湯調下痰盛加薑製半夏一錢生薑五片水一盞熱服口不開灌服一方熱湯溫

酒各小半蓋調勻急灌之下咽喉即眼開氣定自省  
人事一方無甘草○評曰血暈當量虛實若因去血  
過多而暈宜芎藭湯若因痰阻未除人宜茯苓半夏  
湯

半夏三兩 茯苓 熟地黄一兩 陳皮八錢 細辛 人參

芍藥 川芎 紫蘇 桔梗 甘草一兩二錢

右以為散每服四大錢生薑七片煎空心服或血壅  
氣盛人宜牡丹散方內用大黃芒硝恐非產後可輕

服者更不出方或曰奪命丹用大黃奚為而可答曰  
奪命丹兼用附子仍酒下五七小丸可以一時刷勝  
牡丹散大劑煎服無擇翁且令先煎以備緩急謂之  
擾乎可擾擾亦無擾此必無擇親用之則可他人則  
不可

烏金丸

出楊氏家藏方

治產後血暈及惡露未盡腰腹刺痛或

胞衣不下腹脹喘滿

斑猫

四十枚

血竭

一分如無更加沒藥半兩代之

沒藥

半兩

硃砂

三錢



五靈脂

半兩

右件為細末同酒醋各一升半慢火熬成膏子搜藥和丸如梧桐子大每服一十九至十五丸麝香熱酒醋送下不拘時候

苦杖散

出楊氏家藏方

治產後血暈及兒枕疼痛惡露不行臍

腹疼痛

牡丹皮

當歸

洗焙

白芍藥

延胡索

乾漆

炒令煙盡

羌活

去蘆頭

獨活

香附子

炒

紅花

苦杖

一名虎杖

乾姜

炮

蒲黃

肉桂

去粗皮

川芎

甘草

炙

鬼箭羽

已上各等分

右件為細末每服三錢水酒各半盞煎至七分於食前溫服

治產後血暈

用紅藍花蘇枋木酒水濃煮汁飲

治產後去血多眩暈心悶氣絕須臾害人必有不救

出直

方指

用舊漆燒微煙逼面熏之良却不可太甚恐虛怯人  
不禁

治產後血氣上衝心成血暈

出聖  
惠方

用穿山甲一兩童子小便浸一宿取出慢火炙令黃  
色為散每服一錢狗膽少許熱酒調下不時服之

治產後血暈

以將苧麻與產婦枕之

治產後血暈築心眼倒風縮欲死者

出仁  
存方

以荊芥穗搗篩每服用末二錢童子小便一酒盞調  
熱服立効如口噤者挑開閉者灌鼻中皆効

治產後血暈心氣絕

以益母草研汁服一盞

治產後血運心悶氣絕

出肘  
後方

以童小便濃研墨服一升一方用丈夫小便

治產後血氣暈

出聖  
惠方

以醋用美清香稍稍含之即愈一方打破鷄子一枚

投熱醋中攪勻頓服立効

治血暈

出聖惠方

以蘇木三兩細剉水五升煮取二升分再服差若無

蘇木即以緋衣煮汁服亦可即蘇木酒煎服亦得

產後血暈

出海上名方

以乾荷葉為細末溫酒調一錢服

又方

出海上名方

用鰾膠燒灰存性為末三五錢童子小便調酒下

川芎湯

一名芎藭湯  
出危氏方

治產後去血過多暈悶不省及傷

胎去血多崩中去血多金瘡去血多拔牙齒去血多

不止懸虛心煩眩暈頭重目暗耳聾舉頭欲倒宜服

之

方見本門  
諸疾類

治產後血暈悶亂兒枕痛等並宜甜此藥

琥珀

一兩

驚甲

一兩

京三稜

一兩

延胡索

半兩

沒藥

半兩

大黃

六銖

右為散空心酒溫三二錢日再服神驗產後減大黃

沒藥散

出仁  
存方

治產後血暈及血風衝心腹痛

沒藥

當歸

各半  
兩

穿山甲

一  
兩

右為末每服三錢狗膽汁少許煎酒調下童便尤佳

紅藍花湯

治產後血暈氣衝心悶絕

紅藍花

生乾地黃

焙各  
一兩

訶梨勒皮

煨黃  
五枚

右粗為篩每服二錢以水酒共一盞煎七分去滓溫

服如人行二三里再服

益母草散

治產後血暈煩悶

益母草

乾者一兩

藕節

乾者

人參

各半兩

右粗搗篩每服二錢水一盞生薑三片煎至七分再

去滓溫服

桂心散 治產後血塊攻築頭目昏暈

桂

去粗皮

姜黃

各一兩

右為散每服二錢以炒生薑酒調下不拘時候一方

用酒調服

羚羊角散

出千金方

治血暈心中煩悶兼腹痛



羚羊角

燒灰

枳實

去穢麩炒黃  
色各一兩

芍藥

一兩半

右粗羅為散煎酒令溫調一錢七空心晚各一服用

童子小便及湯調下亦可

天麻散 治產後血暈

天麻

訶梨勒

炮過用皮

木香

各一兩

芸薹子

半兩微炒

右粗篩每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服相次

再服

沒藥酒方

治產後血暈及腹痛

用沒藥半兩酒三盞將沒藥磨盡每服一盞煎一沸服

續斷湯 治產後血暈心腹硬乍寒乍熱

以續斷三兩搗篩每服二錢以水一盞煎至七分再去滓溫服

地黃飲 治產後血暈心悶氣絕

以生地黃嫩肥者搗取自然汁每服半盞煎沸服之如未効再服一方用酒相和頓服

地黃散 治產後下血過多氣虛血暈衝心悶亂不知

人事

生地黄

切焙

白芷

延胡索

白膠

炙

赤芍藥

桂皮去粗皮

白朮

劉寄奴

鼈甲

醋炙

丹參

當歸

切焙各等分

荷葉

二斤

右為散每服三錢溫酒調下不拘時

麝香散

出聖惠方

治產後敗血衝心暈悶及腹痛者

麝香

研半兩

丹砂

研半兩

烏鷄毛

臘月者燒

墨

半兩

猪胞子

燒為灰  
五枚

鯉魚鱗

燒灰  
四兩

蘇枋木

剉一  
兩半

油髮

燒灰  
二兩

右為末除前四味搗羅為散和勻每服二錢暖酒送

下

治產後血暈悶亂恍惚不語方

生益母草汁

合一  
地黃汁二

童子小便

合一  
紫葛

細  
研

紅藍花

各一  
兩

右煎五七沸去滓溫服

蘇枋飲 治產後血暈腹悶氣喘急欲死

蘇枋木

二兩

荷葉

炙一兩

芍藥

半兩

桂

去粗皮

一兩

鱉甲

去展襌酥炙一兩

右剉為麻豆大以水五盞藕汁一合同煎取二盞除滓入碧雪一兩分溫二服粥食前如人行三五里候再服

劉寄奴湯

治產後百病血暈

劉寄奴

甘草

各等分

右劉如麻豆大每服五錢先以水二盞入藥煎至一盞後再入酒一盞去滓溫服

紅藍花湯 治產後血暈心煩悶

紅藍花 二兩 紫葛 一兩 芍藥 一兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓後再入生地黃汁半合更煎六七沸溫服不拘時

赤馬通飲子

出聖惠方

治產後血暈惡血不行腹脹滿迷悶

赤馬通 五塊 童子小便

酒 各五合

右和攪馬通調絞取汁熱煖分溫服之

紅藍花散

出聖惠方

治產後惡血不下血暈不識人

紅藍花

荷葉

各等分

右為散每服二錢用生藕汁調下一方用荷葉生薑

湯下

牛膝散

治產後血暈悶及惡血不下

牛膝

去苗酒浸切焙

當歸

切焙

芍藥

各二兩

劉寄奴

一兩半

芍藥

桂

去粗皮

蒲黃

紅藍花

各一兩

琥珀

研

生薑

切焙乾  
各半兩

右為散每服三錢溫酒調下或以水一盞煎七分溫

服亦得

黑神散 治產後血暈眼花黑暗不見物

赤龍鱗

炒  
亂髮燒  
灰

烏賊魚骨

燒灰各  
三分

桂皮

去粗

乾薑

炮

延胡索

牡丹皮

訶梨勒皮

芍藥

芎藭

各半  
兩

當歸

切  
焙

生乾地黄

水蛭

炒一  
分

右為散每服二錢炒生薑酒調下或炒黑豆小便調



亦可得

大黃散 治產後血暈血塊及傷折內損血瘀

羊脰炭

燒赤酒淬十遍五兩

大黃

童子小便浸七日一日一易用濕紙裹煨熟切焙

巴豆

去殼漿炙黃色焙各二兩半

半兩錢

燒赤醋淬為粉新水淘過取細三兩一分

右為散研令勻每服半錢當歸一分童子小便煎濃  
稍溫調下產後血暈當逐血下口噤者幹開灌之後  
識人更一服累經生產有血積堅塊及敗血風勞寒  
熱諸疾當下如爛肝片亦無他疾墜擊內損當歸酒

調下一字

黑桂散

治產後血暈煩悶或身體腫滿發狂瀉痢寒

熱等疾惟有喘者難療

黑豆

炒熟去皮二兩

肉桂

去粗皮

當歸

乾姜

炮

芍藥

生乾地黄

焙

甘草

蒲黃

紙上炒各一兩

右為散每服二錢溫酒調下日三服

治產後血暈方

右極醲醋和所產血一棗大服之井水嚥面

又方

取童子小便磨安息香亦妙

又方

取童子小便蒲黃一兩服亦用醎醋熏面口吸氣妙

治產後血暈不識人狂言亂語

以童子小便磨狗膽灌之最妙

治產暈心悶大困

用鯽魚剝皮作鱠以蒸食三兩口止

又方

取牆頭草一把以水四小升煮取二升分服又生薑汁一小升地黃汁一小升酒一大升相和煎至五六沸分服每劑和大黃末一匙此方甚良

治血暈絕不識人煩悶

赤馱馬糞絞取汁一大盞溫者良若乾者取新汲水半大盞和研絞取汁須服亦主人血不止神驗

治產亂暈絕

覺暈即用三股麻繩長五六尺繫產婦右腳膝上令人捉兩頭急挽得醒徐徐解之

當歸湯 治產後惡血少下氣逆頭目旋暈眼花心悶頭重不舉

當歸 洗切 微炒 芎藭 桃仁 去皮尖 雙仁炒 桂 去粗皮 芍藥

牡丹皮 各半兩

右搗篩分三劑每劑用水五盞生姜五片棗五枚擘同煎取三盞去滓時服一盞溫服

治產後血暈不知人事及狂語

出聖惠方

用麒麟竭一兩細研為末不時溫服酒調二錢

治產後血暈絕

出肘後方

用細斷生雞肝內一斤熱酒中訖漉出滓停酒冷如

人肌一服不能飲者可數口進

治產防暈方

出肘後方

以先火炭燒地令熱即出炭以醇醋洒地令有醋氣  
於上產時必不暈也大効

治產後血暈

產後血暈病急搗紫花根搗汁和酒喫即時免災迤

治產後血風

出大全良方

用大豆炒令煙出以酒水煎服並喫豆佳

敗毒散

出宣明論

治婦人產後骨蒸血暈及治男子往來寒

熱

大黃

黃藥子

紫河車

赤芍藥

甘草

各等分

右為末每服一錢如發熱冷水下如發寒生薑瓜薑

湯一同煎下

此藥偏治婦人

生薑飲

治產後惡血上搶心如見神鬼欲死者

生薑汁

生地黄汁

右各取汁半盞相和一處煎取七分後下酒少許相和溫服

花蕊石散

產經

治產後風欲絕緣敗血不盡血迷血暈惡

血奔心胎死于腹中胎衣不下至死者但心頭熱急以童子小便一錢取下惡物如猪肝終身無血風無



氣痰膈上有血化為黃水即吐出或小便中出也若  
先胎衣則泛泛藥不能達若先治血悶則尋常之藥  
無此功無如此藥有兩全之効也

花蕊

斤一上赤硫黃

兩四

右相拌令勻先用紙和膠泥固瓦罐子一箇內可  
鎔藥候泥乾入藥在內以泥密封口焙籠內焙令  
透熱便安在四方磚上書八卦五行用炭一秤籠  
壘用匝自己午時從下生火令漸漸上徹有墜下

火放火上直至經宿火冷定取出研細以絹羅至細甕合內盛依法用。此藥便是療金瘡花蕊石散人可時時收畜以防急難。有一婦人產後胞衣不下血脹迷悶欲死伊親趙大觀以真花蕊石散用一帖用童便調灌藥下即醒衣與惡物即下無恙。凡金瘡體出血者急以滲之其血化為黃水入臟腑熱煎童便入酒服產後敗血諸症並用童便調下

黑神散

出衛生寶鑑

治婦人產後惡露不下胎衣不下攻衝

心胸病滿或臍堅脹撮痛及血暈神昏眼黑噤口產  
瘀血諸疾並皆治之

熟地黄

一兩蒸七遍

生地黄

一兩

蒲黃

紙上炒當歸酒浸半日焙

乾姜

炮

桂心

白芍藥

各一兩

甘草

二錢炙

黑豆

二合半去皮

右為細末每服二錢酒半盞童子小便半盞一同煎  
調服產後十八病內多用之一方治子死腹中用附

子又一方無生地黃

一熱病胎死

二難產

三胞衣不下

四血暈

五口乾心悶

六乍寒

七虛腫

八乍見鬼神

九月內不語

十腫痛兼瀉更服調中湯

十一遍身痛

十二血崩更服芎藭湯加芍藥或四物湯

十五腹脹嘔逆不定

十六產後口鼻黑色起及鼻衄不可治

十七產後喉中氣喘急不可治

十八中風口噤牙關急緊癰角弓反張兼服荊芥散

已上諸症皆用黑神散仍辨證分曉兼與他藥  
此藥產後不可缺者不問有病無病進三五  
服佳服後若無病則不必多服曾有過服而  
生疾者

來甦散

出濟生方

治臨產氣暈不省人事本因用力太過脉

理衰微精神困倦心胸痞悶眼昏口噤面青髮直命

在須臾急服靈藥

木香

不見火

神麴

剉炒

陳皮

去白

麥蘖

炒

黃耆

去蘆

生薑

切焙

阿膠

剉合

白芍藥

各一錢

糯米

一合半

苧根

洗淨

三錢

甘草

炙三錢

右咬咀每服四錢水一盞煎至八分去滓幹開口灌

下連接再灌知人事可謂更生之人也一方有當歸

消風散 治眼花血暈視物不見

京芎 石膏 茵陳 甘草 菊花 防風

荊芥 阿膠 白朮 南木香

右各等分爲細末每二錢水二盞茶少許煎至八分  
溫服俟頭上微汗出立愈

治催生落胎血暈

用石蠹熟水磨服

治產後血暈煩悶氣喘不識人

出聖  
惠方

用赤小豆三合炒熟爲散不拘時候煎東流水調下

一錢



治產亂暈絕方

出十金方

用神麴末水服方寸匕亦治產難

又方

出千金方

含醎醋嚥面即愈凡悶即嚥之

治產後血暈崩中卒下血

用墨以醋磨服之

烏金散

出聖惠方

治產後血暈下惡血不止疼痛

當歸

一兩剉微炒

紅藍花

一兩

延胡索

三分

麝香

一分細研

桂心

半兩

赤芍藥

一兩

羚羊角屑

已上都搗細羅為散

香墨

一兩

亂髮

二兩

水蛭

一兩

猪胎衣

二兩

鯉魚鱗

四兩

皂莢

二兩

黑豆蘗

一兩

蝨蟲

一兩

已上都入一瓶內以泥固濟燒令煙盡去火候冷再取出細研右相和細研為散不計時候以童子小便調下一錢或熱酒調下亦得

烏金散

出聖惠方

治產後血暈逐血止痛

臘月鳥

一隻

亂髮

二兩

猪胎

小者一枚

竈突墨

一兩

赤魚皮

一兩

已上五味內瓷瓶中密固濟候乾以炭火燒須令通

赤待冷取出細研入後藥

延胡索

沒藥

當歸

剉微炒

小麥蘗

微炒

桂心

琥珀

蒲黃

香墨

各三分

麝香

半兩

細研

右搗細羅為散入前燒了藥同研令勻每服不計時

候以豆淋酒調下二錢服

烏金散

出聖惠方

治產後血暈逐惡血

赤鯉魚鱗

臘月收之  
一斤半

油頭髮

一斤半

敗蒲

半斤

已上味內瓷瓶中內密固濟候乾用炭火燒須令通

徹待冷取出細研入後藥

水蛭

一兩半  
炒令黃

竅蟲

一兩去翅  
足微炒

桂心

一兩  
當歸

一兩到  
微炒

琥珀

一兩  
麝香

半分  
細研

右搗細羅為散入前燒了藥同研令勻細再不計時

候以溫酒調下二錢

紅藍花散

出聖  
惠方

治產後惡血不盡血暈心悶

紅藍花

一兩

當歸

微炒

蒲黃

赤鯉魚鱗

燒灰

桂心

一兩

沒藥

各一兩

右搗細羅為散不計時候以溫酒調下一錢

赤龍鱗散

出聖惠方

治產後心悶下惡血

赤鯉魚鱗

四兩燒灰

蜚蠊

半兩去翅微炒

水蛭

半兩微炒黃色

蒲黃

半兩

亂髮

四兩燒灰

右都研為粉每服半錢以溫酒調下若口急再入乾

狗膽少許研入酒與藥相和服之日三五服以差為

度

胡麻散

出聖惠方

治產後血暈

胡麻子

芸薹子

訶梨勒皮

木香

半兩

益母草

一兩

右搗細羅為散每服一錢以童子小便一中盞煎至五分濾去滓不計時候溫服之

防熱紫湯方

出聖惠方

治產後血

及辟風除血

用黑豆三合炒令煙絕以水三升煎取一升半不計

時候溫一盞服併喫豆佳

逐血調中地黃酒服紫湯後便宜服累用有效

出聖  
患方

生地黃汁

升一生薑汁

合清酒二  
升

右先煎地黃汁三五沸次入生薑汁并酒更煎三兩  
沸每服溫服一小盞日三服

治產後血暈悶煩方

出聖  
患方

紅藍花子

合一棗蠹屑一  
合

右以水二大盞煮取一盞二分去滓不計時候分溫

四服

又方

出聖  
惠方

用乾馬齒莧三兩為散每服三錢以酒一中盞入鹽半盞煎至六分去滓不計時候稍溫服

治血暈及臍腹攻刺疼痛

出聖  
惠方

用赤馬通酒絞汁溫服一小盞立効

治血暈迷悶

出聖  
惠方

羚羊角

燒灰

香墨

半兩



右相和細研不計時候煎薄荷湯調下二錢

又方

出聖惠方

益母草汁

一小盞

生姜汁

半合

右相和一兩沸溫服

赤馬通散

一名逐魂散  
出聖惠方

治產後血暈纔覺惡心頭旋多

涕唾身如在船車上便速宜服

赤馬通

四兩五月五日收  
瓷瓶中燒令赤

麒麟竭

一兩沒藥

一兩

延胡索

二兩當歸

一兩判  
微炒

善濟方

去

右搗羅細為散每服童子小便半中盞水酒各半中盞入散可二錢煎至三五沸時候和滓溫服

紅藍花散

出聖惠方

治產後血暈心悶煩亂不識人

紅藍花

一當歸半兩剉微炒

紫萸

三分

赤芍藥

三分

蒲黃

半兩

桂心

半兩

右搗粗羅為散每服四錢以水一中盞煎至五分濾去滓次入童子小便生地黃汁各一合更煎至一兩沸不計時候溫服

牛膝散

出聖惠方

治產後血暈心腹疼痛悶絕惡血滯澁

牛膝

一兩去苗

劉寄奴

三分

當歸

一兩剉芎藭一兩

赤芍藥

半兩

桂心

半兩

紅藍花

半兩

琥珀

半兩研入

右搗粗羅為散每服三錢以水一中盞入生姜半分

約煎至五分次入酒一合煎三兩沸去滓不計時候

俟溫服

蒲黃散

出聖惠方

治產後血暈煩悶不識人或狂言荒語氣

喘欲絕

蒲黃

二兩

荷葉

三兩

牡丹

三分

延胡索

三分

甘草

三分

微炙

赤剉

右搗篩為散每服四錢水一中盞煎至五分次入蜜

一匙生地黃汁一小盞再煎五七沸去滓不計時分

溫三服

劉寄奴散

出聖惠方

治產後血暈悶絕不識人頰赤手足煩

痛腹脹喘息

劉寄奴

二兩

當歸

二兩

剉

赤芍藥

一兩

吳茱萸

三分

湯

浸七遍

薑

半兩

右搗篩為散每服三錢以酒一中盞煎至六分再去

滓不計時候溫一服

延胡索散

出聖惠方

治產後悶絕不識人

延胡索

一兩

劉寄奴

一兩

當歸

一兩判微炒

紅藍花子

三分

右搗細羅為散每服不計時候以童小便半盞相煖

過調下二錢

鬼箭羽散

出聖惠方

治產後悶絕欲死

鬼箭羽

一兩半

當歸

一兩判微炒

益母草

一兩

右搗細羅為散每服不計時候以童子小便半盞酒  
半盞相和煖過調下二錢

又方

出聖  
惠方

童子小便

五合

地黄汁

二合

當歸

半兩

剉微  
炒為末

右用小便地黄汁浸過馬通絞取汁去滓調當歸末  
不計時候分溫三服

荷葉散

治產後血暈煩悶不識人或狂言荒語氣欲

絕

荷葉

分三蒲黃二

甘草

三兩炙微赤剉

右搗細篩為散每服三錢以水一中盞煎至五分次  
入生地黄汁一合蜜半匙更煎三五沸去滓不計時  
候溫服

生地黄飲子

治產後血暈心煩亂恍惚如見鬼神

地黄汁

合二

生益母草

合二

生藕汁

合二

生鷄子白

枚二

童子小便

合二

右相和微煎三兩沸下鷄子白攪令散分溫二服

益母草飲子 治產後血暈煩悶氣欲絕

益母草汁合二地黃汁合二淡竹瀝合一童子小便合一

紅藍花

半兩  
兩紫葛半兩  
兩

右先以水一大盞煎後二味至五分再去滓入藥汁更煎三兩沸不計時候

赤馬通散 治產後血暈迷悶不醒面色青黑腹內脹滿氣急欲絕

赤馬通

五枚  
焙乾

生地黃

二兩  
切  
乾炒



右細羅為散每服不計時候以童子小便煖過下三錢若悶絕者灌之立効

百草霜散

治產後血暈及悶絕如見鬼神須臾欲絕

百草霜

兩

生薑

二兩去皮炒令乾

姜黃

兩半

劉寄奴散

治產後悶絕狼狽者

劉寄奴

兩

紅藍花

半兩

益母草

兩半

右搗細羅為散每服不計時候以童子小便半盞和

煖過調下二錢

治產後血暈悶煩氣喘急不識人宜服此方

琥珀

三分  
細研

白蜜

二合

右煎湯一大盞都調不計時候分溫三服

又方

蒲黃

半兩

赤芍藥

三分

姜黃

半兩

右搗粗羅為散每服三錢以童子小便一大盞煎至七分濾去滓不計時候溫二服

八寶丸

治血暈

琥珀

別研

沒藥

各半兩研

赤芍藥

當歸

酒浸去蘆

細辛

去葉

硃砂

各半兩

龍骨

麝香

少許

右為細末醋糊為丸桐子大每服三十丸空心醋湯

下

療產後血暈心悶

蒲黃

四分

紫葛

三分

芍藥

八分

紅花

十二分

右咬咀以水二升煎至七合入生地黄汁二合更同

煎三五沸每服三合

牛膝散 治產後血暈煩悶腹脇痛

牛膝

一兩  
去苗

當歸

三分  
剉  
微炒

延胡索

半兩  
芎藭  
三分

鬼箭羽

半兩

益母草

半兩

右搗剉羅為末每服三錢以酒一中盞入生地黃一分同煎至六分去滓不計時候溫服

治產後血暈

用鷄子作酒服之主暖水臍縮小便止耳鳴

牡丹散 治產後血暈氣逆胸膈不利并月水不調凝

滯撮痛或因產後經脉不和惡物不盡一臘內日進  
二服兩臘內日進一服

牡丹皮

紅芍藥

各一兩半

白芷

五分

當歸

去苗

苦杖

紅花

延胡索

官桂

沒藥

陳橘皮

去白各二兩

川芎

二兩二分

右為末每服二錢酒水共一盞生姜二片同煎至七  
分食前稍熱服

治產後血暈面色深赤體如醉見屋旋倒頭痛忽只頭

重不安方

防風 荊芥穗 羌活 獨活 牡丹皮去心 射干

山梔 薄荷 蒲黃 麻黃去根 大黃炮熟各四錢

右為細末食後熱湯調下四錢

金花散出楊氏家藏方 治氣虛血實喘滿煩熱臍腹疼痛及產

後惡血運惡露不快上衝悶亂

香白芷 赤芍藥 當歸洗焙 蒲黃各一兩 紅花

蘇枋木 姜黃各半兩

右件為細末每服二錢水八分酒三分入烏梅一枚  
同煎至七分溫服不拘時候或遇新產血暈惡露不  
快上衝悶亂用童子小便半盞水半盞入烏梅一枚  
同煎溫服

黑虎散

出楊氏家藏方

治產後敗血不盡上衝喘滿昏暈臍腹

脹滿痛或煩渴狂妄神識昏

肥棗

三枚每枚入巴豆三枚

赤鯉魚鱗

乾者一兩

雄狗膽

三枚

血竭

一兩別研

右件入瓷合盛鹽泥固濟勿令透煙炭火燒令赤取出放冷細研入沒藥一兩百草霜三兩再研令勻每服一錢煎以當歸酒調下或煩躁作渴新汲水調下不拘時候

當器之火龍丹

出十便良方

治產後血刺暈迷敗血上衝不

省人事兒枕痛小腹腰痛一切疼痛不可忍者

百草霜

不以多少羅過再研極細

右用頭醋作麪糊丸如彈子朱砂為末每服一粒火



燒焰出醋內蘸過再燒再蘸盡醋半盞為度細研以酒半盞童便半盞調下初一服減腹內痛兩服敗血自下神體和暢三服衣破

神仙索金散

出醫方大全

治婦人產後血暈血虛損積血不

散寒熱往來胸不快氣喘不進飲食骨節疼痛生血肌瘡此藥逐惡血生新血止腹痛

金漆

當歸

川芎

麻黃

官桂

玄胡索

炒

神麴

荊芥

粉草

川牛膝

赤芍藥

熟地黄 雄黑豆 各二兩

右為末溫酒調或當歸童子小便任下

黑神散

出大全良方

防暈備急

驢驘干不計多少以桑柴火燒以刀刮黑煤更刮令盡研為末入麝香少許如纔產了及覺血衝心暈悶取一錢以熱酒和童子小便調下

治產後血下血多氣悶不識人

出護人方

蒼朮

訶子

火炮去核

當歸

吳茱萸

五味子

人參 阿膠炙 龍骨 芎藭 白芷 各一兩

右為細末每服二錢水一盞二分煎取一盞空心和  
滓喫已上藥須是細杵兩三次羅如飛塵方可以餘  
藥末一半入舶上黃一兩相裏煉蜜丸梧桐子大空  
心煎炙艾葉湯下三十丸

灸聖散

出危氏方

治產後血虛肉理不密故多汗因遇風邪

搏之則變瘡口噤不開背強而直如發癇狀搖頭為  
鳴身反折須臾十發氣息即絕宜幹開口此藥灌之

稍緩即汗出兩手拭不及不可治宜加大川烏細辛

防風嫩黃耆

澤蘭葉

石膏

研各二兩

白茯苓

去皮

卷栢

去根

栢子仁

炒

防風

去蘆

厚朴

去粗皮姜汁炙

細辛

去苗

人參

去苗

藁朮

去苗

白芷

乾姜

炮

五味子

川椒

去目及閉口者炒出汗

白朮

各三分

當歸

去蘆

蕪荑

炒

甘草

炙

川芎

各三分

官桂

去皮

兩一分

生乾地黄

一兩半

黃耆

去蘆三分

芍藥

一兩三分

白微

兩半

桔梗

一兩

川烏

三分

阿膠

兩半

丹參

三分

吳茱萸

湯洗七次  
焙炒一兩

治產後血暈悶欲絕者

以生羊血飲一升即活

產後血暈氣攻腹痛

附論

婦人產後衝任俱虛氣血離經失於將理氣道行澁惡露不下少則令人煩懊冒悶臍腹堅痛通行敗血升降陰陽則病可愈不治則變產癥瘕羸瘦之病也○夫產後腹內惡血疔刺疼痛者內藏虛或挾風冷致惡血凝

滯不得宣通故也皆由產時惡露不下胞絡之間有餘血與氣相擊故令腹內疔痛也

方

治產後血氣

產後血氣痛

只有凌霄花

搗來調酒下

其驗實然佳

敗醬湯

治產後惡血不除與氣相搏腹內疔痛

敗醬

桂去粗皮

劉寄奴各三分

牡丹皮

木香

芎藭

各半兩

右粗搗篩每服三錢以水一盞入地黃一分煎取七

分再去滓不計時候溫服

鬼箭羽湯

治產後血氣不散攻心腹刺痛脹滿氣喘

鬼箭羽

當歸

切焙

白朮

剉炒

桂

去粗皮

細辛

去苗葉

生乾地黃

焙一兩

右粗搗篩每服三錢水酒各半盞煎七分去滓溫服

不拘時

不拘時

麒麟竭散

出聖惠方

治產後血氣不調腹內疴痛

麒麟竭

桂去粗皮

當歸剉微炒

蒲黃

紅藍花

木香

沒藥

延胡索

乾漆

碎炒烟出

赤芍藥

各半兩

右為散每服二錢以熱酒下不拘時

黃耆湯

治產後血氣不利腹急痛上下攻衝氣逆煩

悶

黃耆

剉碎

白朮

剉炮

當歸

切炒

甘草

炙剉

人參

各一兩

白羊肉

一斤去脂膜切碎每服用三兩



右除羊肉外搗為粗末每服三錢先以羊肉三兩切  
用水三盞煮取一盞澄清去滓沫入前藥并生姜三  
片同煎七分去滓通口服不拘時候

乾地黄湯 治產後血暈不利或感風冷心腹疼痛肢  
體虛冷胃膈不快

生乾地黄焙三兩 甘草炙 當歸切炒 桂去粗皮

生姜去皮切碎炒  
乾各一兩

右搗篩每服二錢水一盞煎取七分去滓溫服不拘

時候

白朮湯

治產後血氣壅滯攻心腹疼痛或拘急脹滿

白朮

切剉炒

當歸

剉炒

桑根白皮

剉各一兩半

細辛

去苗葉

大黃

剉炒

桂

去粗皮各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞生姜三片煎七分去滓

溫服不拘時候

芍藥湯

治產後因血不快利氣攻心腹疼痛

芍藥

二兩

黃耆

剉

白芷

剉

人參

剉

芎藭

剉

當歸

剉炒

生乾地黄

焙

甘草

炙各一兩

白茯苓

去黑皮一兩半

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓再入酒

少許溫服不拘時候

地黃芍藥湯 治產後血氣虛冷攻心腹痛

生乾地黄

焙

芍藥

當歸

剉炒

獨活

去蘆頭

桂

去粗皮

細辛

去苗葉各二兩

桂

去粗皮

乾姜

炮製

甘草

炙

吳茱萸

水浸經宿炒令香各一兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

不計時候

芎藭前胡湯

治產後心腹痛血氣不利

芎藭

一兩

前胡

去蘆頭  
二兩

黃芩

去黑心  
半兩

芍藥

一兩

蒲黃

微炒  
兩半

當歸

剉炒  
三分

桂

去粗皮  
三分

甘草

炙剉  
一兩

大黃

剉炒  
半兩

生地

焙  
二兩

桃仁

湯浸去皮尖  
別研三分

右粗搗篩每服二錢水一盞生姜三片棗子一枚擘

同煎至七分去滓不拘時溫服

桔梗湯

治產後血氣攻心衝腹冷痛煩滿不食

桔梗炒

當歸

切焙

劉寄奴

湯浸去白

芍藥

二桂去粗

白茯苓

去黑皮

延胡索

二兩

陳橘皮

湯浸去白

白茯苓

去黑皮

芍藥

二兩

右粗搗篩每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服

芍藥湯 治產後血氣攻心腹痛

芍藥

二桂去粗

甘草

炙剉各

芍藥

二兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不

拘時候

琥珀煎 治產後血羸面色萎黃惡血不盡臍腹冷痛

琥珀

研

牛膝

酒浸切焙

當歸

切焙

防風

去義

桃仁

去皮尖雙仁炒研

萆撥

芎藭

各六兩

桂

去粗皮四兩

乾姜

炮二兩

清酒

汁一升

生地黄

汁三升

蜜

三兩

酥

六兩

右以前九味搗羅為散先將地黄汁煎熟即下蜜與酒酥攪候鎔入衆藥末以坳篋攪不住手候以成膏傾出瓷器盛之每服一匙溫酒調下不計時

治婦人產後黃疸惡血衝氣腹痛

用好香附子數升搗去皮毛須要淨白用童子小便

二瓶浸一月一半用好醖醋煮半日及將童便浸的  
晒乾二味搗成細末用酸醋煮麪糊為丸不問美酒  
鹽湯送下不十月即便面色紅容飯食加進勝常顏  
貌速効如神亦治男子黃腫

菴蘭子散

出聖惠方

治產後惡血疔刺腹內疼痛

菴蘭子

三分

赤芍藥

半兩

劉寄奴

半兩

蒲黃

三分

芎藭

半兩

桃仁

三分湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

當歸

一兩剉微炒

右搗細粗羅為散每服三錢以水一盞入生地黃汁

三合煎至六合去滓不計時候稍熱服

大黃散

出聖惠方

治產後血惡攻腹痛不可忍

川大黃

一兩剉

乾漆

一兩搗碎炒令煙出

桂心

一兩

生乾地黄

一兩

乾姜

半兩炮製剉

當歸

三分剉微炒

右為散每服二錢水酒各半中盞煎至五分不計時候去滓熱服之

益母草子散

出聖惠方

治產後惡血腹內疼痛口乾心痛悶

益母草子

半兩

劉寄奴

半兩

芸薹子

三分

肉桂

三分

去皴皮



沒藥

半兩當歸半兩坐微炒

右搗細羅為散每服二錢以水酒各半鍾煎至五分

不計時候和滓熱服

琥珀散

出聖惠方

治產後惡血不散疔刺腹脇疼痛心膈煩

躁虛氣上衝眼見黑花

琥珀 紅藍花 當歸 沒藥 牛李子 蒲黃

姜黃 赤芍藥 莞花

醋拌炒令乾 桂心 各半兩

益母

草三分 延胡索

三分

右搗細羅為散每服不計時候以熱酒調下一錢立

効

牛李子散

出聖惠方

治產後惡血攻心腹疔痛不可忍

牛李子

一桂心一兩

紅藍花

蒲黃

半兩

當歸

半兩

櫻欄皮

二兩炒灰

右搗細羅為散每服不計時候以熱酒調下二錢

鼈甲當歸散 治產後小腹結塊痛不可忍

鼈甲

醋炙去裙襖三兩

當歸

切焙

桃仁

去皮尖雙仁炒

京三稜

炮剉

芍藥

桂去粗皮  
各一兩

右為散每服五錢空心溫酒下日再服。又方用童

子小便調服即醒

方見諸氣  
門氣類

妙香散

出危  
氏方

用生地黃當歸湯調立効

方見心  
臟門心虛類

劉寄奴散

出聖  
惠方

治產後惡血衝心不語

劉寄奴

一兩

麝香

一分  
細研

當歸

剉微  
炒

芎藭

桂心

牛膝

去  
苗

益母草

羌活

生乾地黄

延胡索

已上各三分

右搗細羅為散研入麝香令勻不計時以溫酒生薑

童子小便同調下二錢

通神散

出聖惠方

治產後敗血衝心

蒲黃

一兩去皺皮

肉桂

一兩去皺皮

當歸

半兩剉微炒

延胡索

半兩

硃砂

一分琥珀

半兩

右搗細羅為散不計時候以溫酒調下二錢

烏金散

出聖惠方

治產後惡血攻衝心腹疼痛

好墨 梁上塵 釜下墨 猪胎衣

赤鯉魚鱗

已上各一兩

右都燒為灰入麝香一錢同研令細每服不計時候以熱酒調下二錢

烏金散

出聖惠方

治產後惡血不盡衝心痛氣促煩亂

赤鯉魚鱗

三兩燒灰

櫻櫚

三兩燒灰

竈底墨

一兩釜底墨一兩

亂髮

三兩燒灰

已上五味入甕瓶內密固濟候乾以炭燒須令通赤

候冷取出細研入後藥

蜜蟲

三分去翅  
足微炒

水蛭

三分  
微炒

麒麟竭

一兩麝香

一分  
細研

當歸

半兩剉  
微炒

桂心

右搗細羅為散都杵令勻不計時候溫服生姜酒調

下一錢或生姜童子小便調下亦得

烏金散

出聖  
惠方

治產後敗血衝心疼痛面青手足冷

赤鯉魚皮

二兩

室女頭髮

二兩

伏龍肝

一兩

臘月猪脂

水蛭

一兩

香墨

一兩

已工六味入瓷餅內用鹽泥固濟候泥透乾用炭火再煨令通赤候冷取出細研入後藥

桂心

一兩

當歸

一兩剉微炒

麝香

一兩細研

右搗細羅為散入前燒了藥同研令勻細每服以豆淋酒調下一錢

鱸魚散

出聖惠方

治產後惡血不散衝心痛

鱸魚

二兩

亂髮

一兩

皂莢

一挺長七八寸者為佳

剛砂

一兩

香墨

半兩

穿山甲

一兩半

右研細入瓷餅內用泥固濟候乾用炭火燒須令通赤待冷取出入麝香一分同研令極細每服不計時候用紅藍花湯調下一錢

玳瑁散

出聖惠方

治產後敗血衝心暈絕

玳瑁屑

延胡索

當歸

劉微炒

赤鯉魚鱗

燒灰

麝香

細研三分

琥珀

牡丹

益母草子

水蛭

炒令黃

香墨

各半兩

右搗細羅為散入研了藥令勻每服不計時候以溫



酒調下一錢

又方

用鬼頭灸令熱以慰產婦腹如刀絞痛者熨之立効  
治痛不可忍

取苦瓠蘆未經開者腹攪痛即開去子訖以沸醢酢  
投中蒸熱隨痛即令熨冷即換之甚妙

吳茱萸散

出千金方

治產後血氣不利心腹疼痛或寒或

熱或時吐吐後氣乏力倦及治婦人先有寒冷胸滿

痛食少或腫或下利氣息綿懈欲絕者皆主之

吳茱萸

湯浸微炒一兩

防風

去

桔梗

炒

甘草

炙

乾姜

炮製

細辛

去苗葉各半兩

生乾地黄

焙

當歸

切炒各三分

右麓搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不

拘時候

療血氣痛欲絕

出大全良方

用槐鷄為末酒濃煎頓服立效

大黃乾漆湯

出千金方

治新產後有血腹中切痛

大黃 乾漆 乾地黄 桂心 乾姜 各二兩

右㕮咀以水三升清酒五升煮取三升去滓溫服一升血當下若仍不差明旦服一升日二服病無不瘥

四神散

一名芎歸散  
出和劑方

治產育後留血不消積聚作塊急

切疼痛猶如遁口心腹絞痛不利

當歸 芍藥 川芎 乾姜 炮各等分

右為末每服方寸匕溫酒調下日三服

治婦人血氣痛

乾姜 赤石脂

右為末醋為丸每服五十九淡醋湯下立效

赤龍鱗散

出聖惠方

治產後惡血衝心

石灰

二兩打碎

赤鯉魚鱗

五兩

乾藕節

四兩

亂髮

敗蒲

二椶櫚皮

二兩

紅藍花

一兩

芫花

一兩

右都入瓷瓶子內使鹽泥固濟候乾以搏坯蓋頭再用炭火半秤煨之如人行一二里還來其初青煙出後白烟出經一宿冷取出搗羅細為散加麝香一分

同研令細每服以溫酒調下一錢如人行三五里再服其惡血自下

穿山甲散

出聖惠方

治產後惡血在腹中疔痛不可忍

穿山甲

一兩 兒孩子頭髮

一兩十歲已下佳

乾漆

一兩

紅藍花子

一兩

赤鯉魚鱗

二兩

竈突墨

二兩

右都入於瓷瓶內以瓦子封口用鹽泥固濟於蓋上開一竅以大火燒令煙出白色住火候冷取出細研為散不計時候以熱酒下一錢

烏鵲散

出聖惠方

治產後惡血腹中疔痛

臘月烏鴉

一隻去毛爪

赤鯉魚鱗

一兩

桑木耳

一兩

童子頭髮

一兩

香墨

半兩

礪砂

一兩

右都入一瓷瓶子內以六一泥固濟曝乾先用文火烟出後以武火煨稍時待冷取出擣細羅為散研入麝香一分每服不計時候以熱酒調下二錢

烏金散

出聖惠方

治產後惡血攻心腹疔痛

赤鯉魚鱗

二兩

兔頭

二兩

亂髮

一兩

棧欄

一兩

乾漆

一兩

蜜蟲

半兩去翅足

水蛭

半兩

狗膽

三枚

香墨

一兩

右都入一瓷瓶子內密固濟候乾用炭火燒須令通赤待冷取出搗細羅為散研入麝香一分每服不計時候以生姜溫酒調一錢

黑神散

出聖惠方

治產後一切惡血疔刺腹內疼痛及發渴

煩熱

生乾地黄

鳥巢子

檨葉

椶櫚皮

一好墨一

挺

童子髮

四兩

右都入罐子中以泥封固令乾了以炭火燒須令通赤慢去火候冷取出搗細羅為散不計時候以熱酒調下二錢

當歸散

出聖惠方

治產後惡血不散攻心腹痛

當歸

三分剉微炒

赤芍藥

一兩

劉寄奴

半兩

芎藭

三分

紅藍花

三分

桂心

半兩

延胡索

半兩

沒藥

半兩

右搗細羅為散不計時候以熱酒調下二錢

硃砂丸

出聖惠方

治產後惡血凝結不散刺腹脇疼痛



硃砂

研細

當歸

剉微炒

乾姜

炮製剉

沒藥

芫花

醋拌微炒

蓬莪茂

各一兩

右搗細羅為散研入硃砂令勻在狗膽中以繩子繫懸在竈後令乾取出更研以醋煮麪糊和丸如萊豆大不計時候以熱酒當歸酒下五丸

沒藥丸

出聖惠方

治產後惡血攻刺腹內撮撮疼痛宜服利

經脉止疼痛

沒藥

一兩肉桂

三分去皺皮

當歸

剉微炒

芫花

醋拌炒令乾

地黃炒令黃

五靈脂

乾漆

搗碎抄出

蒲黃

各半兩

右搗羅為末以醋麴糊和丸如梧桐子大不計時候

以酒調下十九

菴蘭子丸

出聖惠方

治積聚惡血攻刺心腹及兩脇疼痛

菴蘭子

延胡索

肉桂

去皺皮

當歸

微炒

五靈脂

沒藥

各一兩

乾漆

搗碎炒令烟出

牡丹

神麴

微剉各半兩

右搗羅為末以醋煮麴糊為丸如梧桐子大不計時

候煎生姜醋湯下二十九溫酒下亦得

硃砂丸

出聖惠方

治產後惡血氣腹中疴刺疼痛

硃砂

半兩  
細研

沒藥

一分

木香

一兩

桂心

半兩

當歸

半兩  
剉微炒

右搗羅為末研入硃砂令勻以醋煮麪糊和為丸如

梧桐子大不計時候以生姜酒下十丸

紅藍花湯

出聖惠方

治產後腹臑有惡血結滯疴刺疼痛

紅藍花

半兩

麒麟竭

半兩

硃砂

一兩  
細研

當歸

一兩  
剉微炒

赤鯉魚鱗

一兩  
燒灰

青蛙

一枚  
去腹肚

桂心

一兩

右搗羅為末先以醋五升於石鍋內煎令沸入諸藥

末一同煎如膏取出於瓷合內盛不計時候以溫酒  
下一茶匙

光花九

出聖惠方

治產後腹有積冷惡血凝滯攻衝心腹疔

痛不可忍

光花

二兩別搗末

當歸

一兩剉微炒

硃砂

一兩細研

蓬莪朮

三分

桂心

半兩

川大黃

一兩剉微炒

右搗羅為末以醋一升熬光花成膏入諸藥末和為

丸如梧桐子大不計時候以醋湯下七丸

治產後惡血積聚攻刺心腹疼痛方

出聖惠方

硃砂

一兩  
乳香一兩

右都研令細用酒一升白蜜二兩攪拌令勻於銀石器內以慢火熬成膏不計時候以暖酒調下半匙

治產後惡血疔痛極甚者方

出聖惠方

芫花

一兩醋拌  
炒令黑

竈突墨

一兩

右同研令細以煮麩末和丸如菉豆大不計時候以溫酒調下五丸

又方

出聖惠方

用牛膝一兩半去苗以酒一大盞半煎至一盞去滓

不計時候分溫三服

又方

出聖惠方

用羌活一兩剉以酒一大盞煎至七分去滓分溫二


服

又方

出聖惠方

用吳茱萸一分湯浸七遍焙乾微炒以酒一大盞煎

至六分去滓溫服二次



普濟方卷三百四十八